


# Flytskjema for håndtering av mistenkte tilfeller av toksikogen huddifteri



\*Ved sterk epidemiologisk kobling hos pasient eller nærkontakt, eller ved sterk kliniske mistanke hos pasienten, kan tiltakene igangsettes FØR det er påvist toksin-gen ved PCR. Ellers avventes PCR svar.

DEFINISJON, HUDDIFTERI	VAKSINASJONSANBEFALING, HUDDIFTERI	ANTIBIOTIKABEHANDLING, HUDDIFTERI
<p><b>Bekreftet toksikogen difteri, hud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påvist difteribakterier (<i>C.diphtheria</i> eller <i>C.ulcerans</i> eller <i>C.pseudotuberculosis</i>) på hud/ i sår OG påvist toksin-gen ved PCR</li> </ul> <p><b>Mulig toksikogen difteri, hud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påvist difteribakterier (<i>C.diphtheria</i> eller <i>C.ulcerans</i> eller <i>C.pseudotuberculosis</i>) på hud/ i sår OG før svar foreligger på toksin-gen PCR</li> </ul>	<p><b>Til pasient, uansett tidligere vaksinasjonsstatus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 doser full-dose kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)</li> </ul> <p><b>Til nærkontakt, tidligere uvaksinert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 doser full-dose kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)</li> </ul> <p><b>Til nærkontakt, tidligere grunnvaksinert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 dose lav-dose kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dtp-IPV) hvis <b>over 5 år</b> siden grunnvaksinasjon eller siste booster</li> </ul>	<p><b>Til pasient</b></p> <p>1.Valg - Erytromycin p.o. 7-10 dager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voksne: 250 mg x 4 eller 500 mg x 2</li> <li>- Barn: 10 mg/kg x 4</li> </ul> <p>2.Valg - benzylpenicillin i.m./i.v. i 14 dager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voksne: 600 mg x 4 (1 mill.IE x 4)</li> <li>- Barn 10-30 kg: 300 mg x 4 (0,5 mill.IE x 4)</li> <li>- Barn &lt; 10 kg: 30 mg/kg x 4 (50 000 IE/kg x 4)</li> </ul> <p><b>Til nærkontakt</b></p> <p>Erytromycin p.o. 7-10 dager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voksne: 250 mg x 4 eller 500 mg x 2</li> <li>- Barn: 10 mg/kg x 4</li> </ul>