

## Oversikt over land med høy forekomst av hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis.

Asylsøkere og andre nyankomne innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av hivinfeksjon, hepatitt B og C og syfilisene bør tilbys undersøkelse. Bakgrunnen er:

- Disse sykdommene gir vanligvis ingen eller få symptomer og kan vanligvis kun avdekkes ved rutineundersøkelse
- Tidlig diagnostikk er vesentlig for å kunne tilby effektiv behandling for å hindre videreutvikling av sykdom
- Diagnostisering av disse sykdommene vil redusere risikoen for smitteoverføring til andre, og smitteverntiltak kan igangsettes.

X = anbefalt tilbud om undersøkelse til asylsøkere, overføringsflyktninger og familiegjenforente etter opprinnelsesland.

<b>A</b>	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Afghanistan		X	X	
Algerie		X	X	X
Angola	X	X		X
Argentina		X		X
Armenia		X	X	
Aserbajdsjan		X	X	
<b>B</b>	Hiv-infeksjon	Hepatitt B	Hepatitt C	Syfilis
Bahamas	X			X
Bahrain		X	X	
Bangladesh		X		
Barbados	X			
Belize	X	X		
Benin	X	X		
Bhutan		X		X
Bolivia		X		X
Bosnia-Hercegovina		X		
Botswana	X	X		X
Brasil	X	X		
Brunei		X		
Bulgaria		X		
Burkina Faso	X	X		X
Burundi	X	X		

<b>C</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Colombia		X		
Costa Rica		X		
<b>D</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Djibouti	X	X		X
Dominikanske rep.	X	X		
<b>E</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Ecuador		X		
Egypt		X	X	
Ekvatorial-Guinea	X	X		X
El Salvador		X		
Elfenbenskysten	X	X		
Eritrea	X	X	X	X
Estland	X			
Etiopia	X	X	X	
<b>F</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Filippinene		X		
For.arab.emirater		X	X	
<b>G</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Gabon	X	X		
Gambia	X	X		
Georgia		X	X	
Ghana	X	X		X
Grønland		X		
Guatemala	X	X		
Guinea	X	X		X
Guinea-Bissau	X	X		X
Guyana	X	X		
<b>H</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Haiti	X	X		X
Honduras	X	X		
Hviterussland	X	X		
<b>I</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
India	X	X		
Indonesia	X	X		X
Iran		X	X	
Irak		X	X	
<b>J</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Jamaica	X	X		X
Japan		X		
Jemen		X	X	
Jordan		X	X	

<b>K</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Kambodsja	X	X		
Kamerun	X	X		
Kapp Verde	X	X		
Kasakhstan		X	X	
Kenya	X	X		X
Kina		X	X	
Kirgisistan		X	X	
Kiribati				X
Komorene		X		
Kongo - DRC	X	X		X
Kongo- Brazzaville	X	X		X
Kosovo		X		
Kuwait		X	X	
<b>L</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Laos		X		
Latvia	X			
Lesotho	X	X		X
Libanon		X	X	
Liberia	X	X		X
Libya		X	X	
<b>M</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Madagaskar		X		X
Malawi	X	X		X
Malaysia		X		
Mali	X	X		X
Marokko		X	X	
Marshalløyene				X
Mauritius	X	X		
Mauritania	X	X		X
Mexico		X		
Mikronesia				X
Moldova	X	X		
Mongolia		X	X	X
Mosambik	X	X		X
Myanmar	X	X		
<b>N</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Namibia	X	X		X
Nauru				X
Nepal		X		
Nicaragua		X		
Niger	X	X		
Nigeria	X	X		X
Nord-Korea		X		

<b>O</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Oman		X	X	
<b>P</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Pakistan	X	X	X	
Palau				X
Palestina		X	X	
Panama		X		
Papua Ny-Guinea	X	X		X
Paraguay				X
Peru		X		
<b>Q</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Qatar		X	X	
<b>R</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Romania		X		X
Russland	X	X	X	
Rwanda	X	X		X
<b>S</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Salomonøyene				X
São Tomé og Príncipe		X		X
Saudi-Arabia		X	X	
Senegal	X	X		
Sentralafrikanske rep.	X	X		X
Serbia		X		
Sierra Leone	X	X		X
Singapore		X		
Somalia	X	X	X	X
Sri Lanka		X		
Statsløs	X	X	X	X
Sudan	X	X		X
Surinam	X	X		
Swaziland	X	X		X
Sør-Afrika	X	X		X
Sør-Korea		X		
Sør-Sudan	X	X		X
Syria		X	X	
<b>T</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Tadsjikistan		X	X	
Taiwan		X		
Tanzania	X	X		X
Thailand	X	X		
Togo	X	X		
Trinidad & Tobago	X			
Tsjad	X	X		X
Tunisia		X	X	

Turkmenistan		X	X	
<b>U</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Uganda	X	X		X
Ukraina	X	X		
Uruguay				X
Usbekistan		X	X	
<b>V</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Venezuela		X		X
Vietnam		X	X	
<b>Z</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Zambia	X	X		X
Zimbabwe	X	X		X
<b>Ø</b>	<b>Hiv-infeksjon</b>	<b>Hepatitt B</b>	<b>Hepatitt C</b>	<b>Syfilis</b>
Øst-Timor				X

Anbefalt testing for hiv, hepatitt C og hepatitt B gjelder for alle aldre, syfilis testing anbefales ikke hos barn < 15 år.

For tuberkulose se [Land med høy forekomst av tuberkulose](#)

## Bakgrunn for anbefalingene og kilder

- **Hepatitt B:** WHO. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens >2% hos voksne (mellom- og høyendemiske områder) er anbefalt testet <http://apps.who.int/ithmap/>  
<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-b>
- **Hepatitt C:** CDC. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens >3,5% (høyendemiske områder) er anbefalt testet <http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-c>.
- **HIV:** Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens > 0,5% hos voksne i alderen 15-49 år (mellom- og høyendemiske områder) er anbefalt testet.  
[http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HIV\\_estimates\\_with\\_uncertainty\\_bounds\\_1990-2015](http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HIV_estimates_with_uncertainty_bounds_1990-2015)
- **Syfilis:** WHO. Innvandrere fra opprinnelsesland med angitt prevalens hos gravide > 1,0 % er anbefalt testet (høyendemiske områder).  
[http://gamapserver.who.int/gho/interactive\\_charts/sti/anc\\_syphilis\\_positive/atlas.html](http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/sti/anc_syphilis_positive/atlas.html)

I tillegg er det for enkelte opprinnelsesland anbefalt testing for hepatitt C selv om de kommer under disse prevalensgrensene. Grunnen til dette er at MSIS har fått rapportert forholdsvis mange tilfeller av hepatitt C fra disse landene. Dette gjelder Pakistan, Afghanistan, Vietnam, Eritrea, Etiopia, Somalia og Russland.